

Corrector de suelos salino sódicos-
Estructurador del suelo

ECO
SALT

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Calcio (CaO)	11,0	14,96
Polisacáridos ácidos, ácidos tricarbónicos y azúcares reductores	20,0	27,2
Solubilidad a 20°C:	100%	
pH (solución al 1%):	4,84	
Densidad (g/ml):	1,36	
CONTENIDO EN METALES PESADOS: Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg, Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.		

CONTENIDO: 20l
BOAMERICA

A BASE DE POLISACÁRIDOS ÁCIDOS, ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS Y AZÚCARES REDUCTORES



CARACTERÍSTICAS:

Los polisacáridos ácidos y los ácidos tricarbóxicos de **ECOSALT** tienen en su estructura una elevada proporción de grupos hidróxilo (-OH) y carboxilo (-COO). Estos grupos aseguran una elevada eficacia como intermediarios en el intercambio de calcio de la fracción insoluble a la fracción coloidal, desplazando el sodio a la fracción soluble donde se elimina fácilmente por lavado. **EFFECTOS FÍSICOS:** Floculación: Mayor porosidad y mejor penetración del agua.

EFFECTOS QUÍMICOS: Disminución del sodio de la fracción coloidal. Aumento de la fracción intercambiable de calcio. Estabilización del pH.

EFFECTOS AGRONÓMICOS: Mejora la germinación. Mayor desarrollo radicular. Incrementa la disponibilidad de calcio para la planta.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Tomate Pimiento Melón Lechuga	Aplicar al inicio de la temporada de riego y repetir cada 30 días.	40-60	Aplicar vía riego tecnificado. Repetir según monitoreo de *CE de la solución de suelo.
Cítricos y Palto	Aplicar al inicio de la temporada de riego.	60-80	
Uva de Mesa	Aplicar al inicio de la temporada de riego, 15 días antes de la brotación.	60-80	
	Aplicar desde inicio de brotación.	20-30	Repetir cada 30 días desde brotación hasta caída de hojas (dosis de mantenimiento).

*CE conductividad eléctrica

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

COMPATIBILIDADES:

No mezclar con trifluralina en los cultivos sensibles a los productos fluorados ni con productos ricos en fósforo por incompatibilidad física.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas

MODO DE EMPLEO:

Agua con conductividad entre 0,8 y 4 mmhos/cm:

15-60 cc/1000 litros. Aumentar 10 cc por cada unidad de conductividad.

AGITAR ANTES DE USAR.

NO CONTIENE CLORUROS.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20L

IMPORTADOR:

BIOAMERICA

BIOAMÉRICA, S.A.

Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2

Paine, Santiago – Chile

Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl

www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO
bioscience

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.

Av. del Cadi, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta

08799 Olerdola. Barcelona - España

www.futurecobioscience.com

corporation@futurecobioscience.com