



Dow AgroSciences

Herbicida

Admitt[®]

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Admitt[®] es un herbicida inhibidor de la acetolactato sintetasa (ALS), para ser utilizado en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo del trigo, según se indica en las instrucciones de uso.

Contenido por Envase

*Proxsulam:	7,5 % p/p (75 g/kg)
**Cloquintocet-mexilo (protector)	7,5% p/p (75 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)
* N(5,7-dimetoxil)2,4triazolo[1,5-d]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamida	
** (5-cloroquinolin-8-iloxi)acetato de 1-metilhexilo	

* Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow
* Marca registrada de Dow AgroSciences

Autorización del Servicio Agrícola y

Ganadero N° 3.528

Número de lote o partida:

Fecha vencimiento, mes y año:

Nombre y dirección del fabricante: Dow

AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN
46268, Estados Unidos ó Schrim GmbH: 23568 Luebeck,
Mecklenburger Str. 229, Alemania.

Nombre y dirección del Importador: Dow AgroSciences Chile S.A., América Vespucio

100, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

Contenido neto: (ver envase)

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

Características y forma de acción del

producto: **Admitit®** es un herbicida postemergente de amplio espectro que controla malezas gramíneas y latifoliadas en el cultivo del trigo. Inhibe la acetolactato sintetasa (ALS), enzima fundamental en la síntesis de amino ácidos como isoleucina, leucina y valina.

Admitit® controlará las malezas emergidas más eficientemente durante sus primeros estados de crecimiento. Presenta cierta actividad residual en el control de las malezas indicadas en las instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicaciones terrestres:

Cultivo	Dosis (g/ha)	Malezas	Observaciones
Trigo de invierno	240 - 320	Avenilla Ballicas Cola de zorro Bromo	Aplicar en post emergencia temprana del cultivo. Aplicar cuando las malezas presenten 2 - 3 hojas hasta 1 - 2 macollas. Utilizar dosis mayores en presencia de malezas de mayor desarrollo (más de tres hojas) y temperaturas menores a 7°C. También en situaciones de alta presión de ballicas y cola de zorro.

PERIODO DE CARENCIA: No

corresponde.

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Llene el estanque hasta la mitad y agregue la cantidad de **Admitit®** necesarias para la superficie que se va a tratar. Agitando complete el volumen de agua necesario (80 – 200 L agua/ha).

OBSERVACIONES: Eventualmente, es posible encontrar en algunos lugares específicos, una alta presión de malezas resistentes a herbicidas que inhiben la enzima ALS, frente a esta situación, es recomendable utilizar **Admitit®** dentro de un programa integral de control de malezas, realizando una aplicación de Treflan® o Espada® después de la siembra, en preemergencia del trigo. Este tratamiento complementará el espectro de acción de

Admitit®, que se debe aplicar en postemergencia temprana del cultivo, utilizando en estos casos la dosis más alta del rango recomendado. Realizar este programa integral de control de malezas, permitirá reducir la presión de selección sobre la población de malezas, evitando así incrementar el problema de resistencia.

COMPATIBILIDAD: **Admitit®** puede ser utilizado en mezcla con Starane® Xtra, Lontrel® 3A, MCPA y Combo®. Es recomendable usarlo en mezcla con aceite vegetal de uso agrícola ó

surfactante no iónico.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con surfactantes siliconados, ni con Dicamba.

FITOTOXICIDAD: **Admitir®** no presenta fitotoxicidad en trigo si se siguen las instrucciones de la etiqueta. en situaciones de estrés del cultivo, puede producirse amarillamiento que no producirá mermas de rendimiento.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES: Una aplicación por temporada.

Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicaciones aéreas:

Cultivo	Dosis (g/ha)	Malezas	Observaciones
Trigo de invierno	240 - 320	Avenilla Bailicas Cola de zorro Bromo	Aplicar en post emergencia temprana del cultivo. Aplicar cuando las malezas presenten 2 - 3 hojas hasta 1 - 2 macollas. Utilizar dosis mayores en presencia de malezas de mayor desarrollo (más de tres hojas) y temperaturas menores a 7°C. También en situaciones de alta presión de bailicas y cola de zorro. Utilizar mojamientos de 40 – 50 L agua/ha.

TIEMPO DE REINGRESO: Esperar 4 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas y animales al área tratada.

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, esto puede ocurrir a **Admitir®** como a otros herbicidas de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal (mutación) en cualquier población de malezas. En estos casos el uso repetido de este grupo de herbicidas puede llevar a estos biotipos de malezas a ser dominantes por lo que serán de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **Admitir®**, por lo que Dow AgroSciences no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Dow AgroSciences garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenamiento.

Abril 2018

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: Piroxslam pertenece al grupo químico de las triazolopirimidinas, y el protector cloquintocet-mexilo pertenece al grupo químico de los ésteres 8-quinolinocarboxílicos. Durante la preparación del producto usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. Durante la aplicación, usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. No aplique contra el viento y evite respirar vapores de la aplicación. No comer, beber ni fumar durante el uso del producto. Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo.

Almacenaje: Almacenar bajo llave, en lugar ventilado, fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas no responsables. No se almacene en el mismo lugar con herbicidas volátiles. No almacenar con alimentos ni con semillas.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede producir irritación ocular.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Consulte a un médico. En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consiga atención médica. En caso de **ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Consiga atención médica. En caso de **inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGEN-

CIA: Realizar tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe antídoto específico.

EN CASO DE INGESTION Ó INTOXICACION

LLAMAR AL (2) 2635 3800 CONVENIO

INTOXICACIONES CITUC/AEIPA O AL (2) 2247

3600 CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS, EN

CASO DE ACCIDENTE. TELEFONOS DE

EMERGENCIA - ATENCION LAS 24 HORAS.

CONSULTAS DOW AGROSCIENCIAS (2) 2440 4800

Riesgos ambientales: **Admitit®** es virtualmente no tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para algas y peces y prácticamente no tóxico a aves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Instrucciones para el triple lavado: Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciado el envase; agregue agua hasta ¼ de su capacidad, cierre y agite durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces. Posteriormente, perforo el envase para evitar su reutilización y entreguelo en centros de acopio autorizados.