

PHEROCON® CM

INFORMACION GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Codlemona
NOMBRE QUIMICO	(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemona)
GRUPO QUIMICO	Alcoholes alifáticos insaturados
CONCENTRACION Y FORMULACION	1,0 mg/cápsula (100% p/p), Feromona Evaporable (VP)
MODO DE ACCION	Feromona sexual.
FABRICANTE/FORMULADOR	Trécé Incorporated.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Arysta LifeScience Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que Normalmente No Ofrece Peligro. Banda verde.
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico.
AUTORIZACION SAG N°	4.018

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
<p>PHEROCON® CM se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla de la Manzana en Manzanos, Perales, Nogales, Membrillos y algunos Carozos (Damascos, Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos y Almendros) que son afectados. Permite tener una herramienta y/o referencia para programar, evaluar su control y las aspersiones que correspondan. PHEROCON® CM NO SE RECOMIENDA PARA CONTROL DE POLILLA. Las Trampas PHEROCON® CM se instalarán previo al inicio del primer vuelo. PHEROCON® CM entrega resultados sobre el vuelo del macho, el que se deberá interpretar de acuerdo al folleto adjunto y/o las instrucciones del especialista o asesor.</p>

INSTRUCCIONES DE USO			
CULTIVO	PLAGA	DENSIDAD DE TRAMPAS	OBSERVACIONES
Huertos de Manzanos, Perales, Nogales, Membrillos y algunos Carozos (Damascos, Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos y Almendros).	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	Huertos de 1 - 8 ha: 1 Trampa cada 2 a 2,5 ha	<p>PHEROCON® CM se deben armar siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual de armado que viene en la caja. Se deben colgar desde la altura máxima del árbol 0,80 - 1,00 mt hacia abajo, en la porción exterior de la copa. Las Trampas deben quedar instaladas en hileras interiores del huerto, protegidas del polvo, viento, equipos y maquinarias. Las Trampas se deben revisar en la mañana cada 2 a 3 días y anotar las capturas. Una vez chequeada limpiar la trampa de los individuos capturados y esparcir nuevamente el pegamento. Sugerimos leer las indicaciones del Manual de Trampas de Arysta LifeScience Chile S.A. Las Trampas se cambiarán completamente, a los dos meses o cuando estén muy sucias, lo que ocurra primero. Es necesario sacar las Trampas o cubrirlas con un plástico al rastrear el huerto para evitar que éstas se ensucien. Las cápsulas se reemplazarán cada 10 semanas, se debe abrir el envase de la cápsula la noche previa a la instalación o el recambio. Una vez abiertas las cajas con las cápsulas se deben guardar en un lugar fresco donde la temperatura no supere los 15° C durante los 6 meses. Si se guardan de un año para otro se deben almacenar refrigeradas en el sector de las verduras, no junto a ellas, sino a la temperatura a la cual se encuentra el refrigerador en esa zona (4 a 5° C).</p>
		Huertos de 8 - 16 ha: 1 Trampa cada 3 a 4 ha	
		Huertos de 16 - 32 ha: 1 Trampa cada 5 a 6 ha	

RECOMENDACIONES

Para esta densidad de Trampas los huertos deben ser uniformes en tamaño, especie y variedad frutal. Si no fuese así, cada huerto deberá tratarse como un caso individual. Los huertos nuevos deben monitorearse separadamente, ya que por su copa menos densa permiten un anticipo de la emergencia de los insectos. En estos casos se recomienda efectuar las instalaciones de Trampas una semana antes, por lo menos, que lo indicado para huertos adultos.

INCOMPATIBILIDAD

No corresponde por la naturaleza del producto.

FITOTOXICIDAD

No corresponde por la naturaleza del producto.

PERÍODO DE CARENCIA

PHEROCON® CM, está libre de Carencias por ser un producto natural emitido por los insectos y no se aplica sobre los cultivos, sino que se instala como Trampa.

TIEMPO DE REINGRESO

No tiene restricción en el tiempo de reingreso por la naturaleza del producto.

®**PHEROCON** es Marca Registrada de TRÉCÉ Inc.