

## **ACCENT®**

INGREDIENTE ACTIVO	Nicosulfuron
NOMBRE QUIMICO	Nicosulfuron: 2-(((4,6-dimetoxipirimidin-2-il)aminocarbonil)aminosulfonil)-N,N-di-3-pirimidina carboxamida monohidrato.
GRUPO QUIMICO	Sulfonilureas
CONCENTRACION Y FORMULACION	750 g/ Kg/ Granulado dispersable (WG)
MODO DE ACCION	Sistémico
FABRICANTE/ FORMULADOR	Du Pont de Nemours & Co. Agricultural Products Department, Wilmington, Delaware, 19898, Estados Unidos
DISTRIBUIDOR EN CHILE	DuPont Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro LD50 producto comercial: dermal > 2000 mg/ kg (conejo) oral > 5000 mg/ kg (rata)
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico.
AUTORIZACION SAG N°	3216

### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**ACCENT®**, es un herbicida sistémico y selectivo para el control de algunas malezas gramíneas anuales y perennes en el cultivo de maíz.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

#### **CONTROL DE MALEZAS GRAMINEAS ANUALES**

<b>Cultivo</b>	<b>Malezas Susceptibles</b>	<b>Dosis</b>	<b>Observaciones</b>
		<b>gr/ ha</b>	
Maíz	Maicillo y Hualcacho	70	Aplicar sobre maíces de entre 4 a 8 hojas verdaderas. Para maicillo, aplicar 70 gr sobre plantas de 15 a 45 cm de altura, o usando 35 gr cuando estas plantas de maicillo tengan 10 a 20 cm, luego repetir 35 gr cuando los nuevos rebrotes alcancen nuevamente este tamaño. Para hualcacho, aplicar los 70 gr cuando las plantas tengan de 2 a 3 hojas, o parcializar la dosis en 35 + 35 gr, cada vez que estas malezas alcancen este tamaño de 2 a 3 hojas.

**VOLUMEN DE AGUA:** Se recomienda usar un mínimo de 200 L/ ha. Este volumen variará de acuerdo al desarrollo del maíz y de las malezas.

No realizar aplicaciones cuando existan vientos de más de 15 km/ hr o cuando existan condiciones ambientales que puedan favorecer la deriva.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** mida la cantidad necesaria de **ACCENT®**, introduzca la bolsa hidrosoluble directamente al estanque aplicador a medio llenar y con el agitador funcionando. Luego se terminará de llenar el tanque con agua. La preparación deberá usarse dentro de las 24 horas de preparada.

Se recomienda no usar más de 70 gr de **ACCENT®**/ ha/ año.

**FITOTOXICIDAD:** **ACCENT**<sup>®</sup> usado según las instrucciones de uso de la etiqueta no produce fitotoxicidad en las plantas de maíz. Esta fitotoxicidad está dada por la capacidad de las plantas de maíz de poder metabolizar rápidamente este herbicida, como esto podrá variar de acuerdo a las condiciones genéticas que presentan los diferentes cultivares de maíz, se recomienda consultar directamente con las empresas productoras de semilla.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda mezclar **ACCENT**<sup>®</sup> con insecticidas organofosforados, ni aplicarlo antes o después que insecticidas sistémicos de este grupo. No compatible con 2.4 D y bentazona-sodio.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Se recomienda esperar al menos 3 horas, hasta que la aplicación se haya secado. No corresponde tiempo de reingreso para animales, ya que los cultivos no son recomendados para uso animal.

**CARENCIAS:** Maíz en grano y forraje, no aplicar con maíces de más de 8 hojas (40 días).

#### **PRECAUCIONES**

Se recomienda mezclar con un surfactante no iónico.

No se recomienda sembrar otro cultivo diferente de maíz, antes de haber pasado 4 meses desde la última aplicación de **ACCENT**<sup>®</sup>.

No aplicar, limpiar o vaciar el equipo cerca de árboles o plantas que no se desee eliminar o en áreas hasta donde puedan extenderse las raíces de aquellas plantas, o en lugares donde el producto pueda ser lavado o arrastrado hacia estas áreas. Prevenir la deriva hacia áreas con plantas susceptibles. No contaminar ninguna fuente de agua, incluyendo aguas de riego que puedan ser usadas en otros cultivos. Observe cuidadosamente las instrucciones de limpieza de los equipos de aplicación. Evite el contacto con animales y personas. Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras.

**ACCENT**<sup>®</sup> es una marca Registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co.