

**MAXINYL<sup>®</sup>**  
**Solución inyectable**  
**REG. SAG N° 1618**



**COMPOSICIÓN**

Cada 100 ml contiene:

Nitroxinil 34 g

Excipientes c.s.p.

**ESPECIES**

Bovinos, ovinos.

**INDICACIONES**

Fasciolicida, oestricida y antihelmíntico.

**ADMINISTRACIÓN Y DOSIS**

Vía subcutánea en dosis única.

**Bovinos:** Para *F. hepática* adultos 1 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (6.8 mg/kg). La dosis puede ser elevada a 1.5 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (10 mg/kg) a efectos de aumentar su eficacia sobre formas de 8 semanas.

*H. placei*, *O. radiatum*, *B. phlebotomum*: 1.5 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (10 mg/kg).

**Ovinos:** Para *F. hepática* adultos 1 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (6.8 mg/kg). La dosis puede ser elevada a 1.5 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (10 mg/kg) o 2 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (13.6 mg/kg) a efectos de aumentar su eficacia sobre formas de 6 y 8 semanas.

*H. contortus*, *O. venulosum*, *O. columbianum*, *B. trigonocephalum*: 1.5 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (10 mg/kg).

Es activo contra cepas de *H. contortus* resistentes a benzimidazoles, salicilanilidas y avermectinas.

Larvas de *O. ovis* 2 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (13.6 mg/kg). Esta dosis puede ser elevada a 2.5 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (16 mg/kg) o 3 ml Maxinyl<sup>®</sup>/50 kg (20 mg/kg) a efectos de aumentar su eficacia sobre formas de primer y segundo estadio.

**PRECAUCIONES**

A las dosis indicadas no presenta efectos secundarios. En ocasiones provoca ligeras reacciones inflamatorias en el sitio de aplicación, que remiten en pocos días. Puede manchar manos, el cuero o la lana. Como en el caso de otros medicamentos, reacciones de naturaleza alérgica o anafiláctica, algunas veces de curso fatal pueden darse en animales hipersensibles y aunque son muy poco frecuentes a los primeros signos suspender el tratamiento. Tal como sucede con otros antihelmínticos podrían aparecer cepas de *Haemonchus contortus* resistentes al nitroxinil.

**PERIODO DE RESGUARDO**

Carne: 60 días.

No usar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

En vacas preñadas el último tratamiento debe realizarse al menos 15 días antes del parto.



**PRESENTACIÓN**

Frasco x 50 - 500 ml.

**VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA**