



HERBICIDA



Máxima potencia y velocidad de control en malezas

- *Mayor velocidad de absorción y traslocación.*
- *Fácil disolución.*
- *Rápida homogenización en la mezcla.*
- *Proporciona una mayor estabilidad a la mezcla.*
- *Disminuye necesidad de agitación constante del estanque.*
- *Formulado en Gránulos Solubles (SG).*



HERBICIDA


**ALTA TECNOLOGÍA EN
EL CONTROL DE MALEZAS**


Gracias a la tecnología **Transorb II**®, penetra mucho más rápido que otro glifosato genérico. Con **Transorb II**® absorbe hasta 3 veces más rápido.



ROUNDUP® ULTRAMAX, el herbicida elaborado con alta tecnología, presentado en su formulación de Gránulos Solubles (SG), que permite trabajar en períodos de aplicación estrechos para una mayor potencia y velocidad de control en malezas gramíneas, de hoja ancha, grandes y rustificadas, y que además tiene gran eficiencia en malezas con pilosidad foliar y con superficie foliar cerosa.

USOS Y DOSIS			
	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (kg/ha)
MALEZAS ANUALES	Ballicas Pasto Perro Pega Pega Cola de Zorro Avenilla Manzanilla Pata de Pollo Mostacillas	Lolium sp. Bromus sp. Setaria sp. Cynosurus Echinatus Avena Fatua Matricaria, Anthemis sp. Polygonum Aviculare Sisymbrium, Rapistrum	1,1 - 1,6
	Hualcacho	E. Crusgalli	1,6
	Bledo Quinguilla Rábano Verdolaga	Amaranthus sp. Chenopodium sp. Raphanus Sativus Portucala Oleracea	1,1
	Pata de Gallina	Digitaria Sanguinalis	0,8 - 1,3
	Enredadera	Biderdyckia Convolvulus	1,1 - 1,4
MALEZAS PERENNES	Pasto Quila Pasto cebolla	Agrostis sp. Arrhenatherum Elatius	1,1 - 1,6
	Falso Té Maicillo Siete Venas	Bidens Aurea Sorghum Halepense Plantago Lanceolata	1,6 - 2,2
	Galega Junquillo Carrizo	Galega Officinalis Junqus sp. Phragmites Communis	2,2 - 3,2
	Chépica Chépica Gigante	Paspalum Paspalodes Paspalum Dilatum	2,2
	Chufa	Cyperus sp.	2,7 - 3,2
	Pasto Bermuda	Cynodon Dactylon	3,2
	Correhuela Malva	Convolvulus Arvensis Malva sp.	3 - 4
MALEZAS ARBUSTIVAS	Ulex Zarzamora Maqui Bacharis Mayo Boldo Litre Roble Quillay Fuinque Palqui Brea o Peril Romerillo	Ulex Europeus Rubus sp. Aristotelia Chilensis Baccharis sp. Sophora Macrocarpa Peumus Boldus Lithrea Caustica Nothofagus Obliqua Quillaja Saponaria Lomatic Ferrugina Cestrum Parqui Plucea Absinthiodes Baccharis sp.	(*) 3 - 5
	Control de Tocones		Aplicar en dosis de 5 - 7% hasta 24 horas después de haber realizado el corte y con precaución de dejar bien cubierto el cambium.

(*) Bajo ciertas circunstancias la adición de Metsulfuron Metil en dosis de 32 a 64 g/ha mejora la adición sobre estas malezas.



Lo expresado en este folleto no constituye una recomendación.
Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. * marcas registradas.