

FICHA TÉCNICA

SOLUTION IVER+ABA®
Ivermectina 2,25 g – Abamectina 1,25 g
Solución inyectable

Composición:

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	2,25 g
Abamectina	1,25 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Indicaciones de uso:

Solution IVER+ABA® es un antiparasitario indicado para el tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales y pulmonares tales como; *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Cooperia* spp., *Bunostomum phlebotomum*., *Oesophagostomum radiatum*, *Dictiocalus viviparus*, *Trichuris* spp, también para parásitos externos como ácaros; *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis* y piojos chupadores tales como; *Linognathus vituli* y *Haematopinus eurysternus*.

Especies de destino:

Bovinos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

USAR SOLO COMO SE INDICA

Solution IVER+ABA® debe ser administrado subcutáneamente como una sola dosis al nivel de dosificación recomendado de 1 ml por 50 kg de masa corporal (450 µg ivermectina por kg masa corporal, 250 µg Abamectina por kg masa corporal). Usar equipamiento estéril y seguir los procedimientos asépticos. No diluir o mezclar con ninguna otra sustancia.

Volumen de dosificación

Peso (kg)	Volumen dosis (ml)
50	1
51 – 100	2
101 – 150	3
151 – 200	4
201 – 250	5
251 – 300	6
301 – 350	7
351 – 400	8
401 – 450	9
451 – 500	10
501 – 550	11
551 – 600	12

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No administrar en terneros menores de 16 semanas de edad.
No administrar intravenosamente o intramuscularmente

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Es recomendado vacunar los bovinos contra infecciones por *Clostridium* previo al tratamiento con Solution IVER+ABA®.
No reutilizar las botellas vacías.
Mantener lejos del alcance de los niños y personas desinformadas.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No diluirse ni mezclarse con otras sustancias.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

El producto es libre de efectos colaterales indeseables cuando se administra subcutáneamente en la especie indicada y con un nivel de dosis correcto.

Período de resguardo:

Carne: 105 días

Leche: No administrar en vacas cuya leche sea destinada a consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Medidas técnicas: Usar un local ventilado en la fuente de la contaminación. Proporcionar una ducha ocular e instalaciones sanitarias cerca del lugar del trabajo.

Medidas de protección especiales: Lavarse las manos y partes expuestas del cuerpo con jabón después del trabajo.

Precauciones especiales: No rociar cara al viento. Evitar el contacto con químicos o superficies contaminadas. No fumar ni comer mientras se manipula el producto.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco entre 15° y 30°C.

Proteger de la exposición directa a la luz solar y humedad.

Presentación:

Caja conteniendo frasco de 50, 500 y 1000 ml.

Fabricado por:

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

Rodovia Anhanguera SP 330 s/n°, Km 298, Cravinhos, Estado de Sao Paulo, Brasil.

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°2128-B