

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACION)

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Cero y Mínima labranza: Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Triticale, Maíz, Arroz, Arveja, Haba, Frejol, Garbanzo, Lenteja, Lupino, Raps, Espárrago, Papa, Remolacha, Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, Zanahoria. También en frutales (Almendro, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Vid, Kiwi, Limonero, Lima, Naranja, Pomelo, Mandarin, Tangerina, Tangelo, Nispero), frutales menores (Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarparrilla), y cultivos Ornamentales (Rosales, Clavel, Clavelón, Hortensia, Crisantemo, Gladiolo, Narciso, Iris, Tulipán, Liliun, Ficus, y Astromelia).	Malezas gramíneas anuales: Ballica, Avenilla, Poa o Piojillo, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pega, Pasto del perro, Bromo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia, Cola de ratón. Malezas gramíneas perennes: Chépica o Pasto quila, Pasto cebolla, Maicillo, Chépica gigante, Pasto bermuda. Malezas hoja ancha anuales: Bledo, Amor seco, Bolsita del pastor, Cardo, Romanza, Chamico, Hierba cana, Senecio, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Verdolaga, Vinagrillo. Otras malezas perennes: Falso té, Achicoria, Siete venas, Hierba azul, Galega, Junquillo, Chufa o Coquillo, Correhuela, Malva, Zorzamora.	1,5 – 3,0	Aplicar con maleza emergida al momento de la siembra. Cultivos ornamentales se refiere a que por forma y distancia de plantación, es posible hacer aplicaciones basales dirigidas al piso y usando protectores de boquillas de manera de localizar el producto, como por ejemplo en el caso de rosales, arbustos y matorrales usado como especies ornamentales en parques y jardines.
Maíz, Espárrago, Papa, Remolacha, Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, Zanahoria.			Aplicación selectiva entre hileras, evitando mojar el cultivo. Aplicar en maíz cuando tenga unos 40 cm de altura.
Alfalfa			Aplicar en latencia invernal o inmediatamente después de un corte, desde el segundo año del cultivo en adelante.
Praderas			Aplicación de limpieza y renovación de praderas.
Terrenos agrícolas no cultivados (Bordes de caminos, Canales)			Aplicar cubriendo muy bien la maleza. En limpieza de canales aplicar sobre los bordes en dirección contraria a la corriente de agua.

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACION)

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Raps, Maíz, Trigo, Papa, Trébol. Desecante Foliar	Malezas gramíneas anuales: Ballica, Avenilla, Poa o Pijillo, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pega, Pasto del perro, Bromo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia, Cola de ratón.	1,5 – 2,5	Como desecante foliar, para facilitar la cosecha se recomienda aplicar unas 2 a 3 semanas antes y con humedad de grano hasta un 35%. Máximo 1 aplicación por temporada.
Remolacha	Malezas gramíneas perennes: Chépica o Pasto quila, Pasto cebolla, Maicillo, Chépica gigante, Pasto bermuda. Malezas hoja ancha anuales: Bledo, Amor seco, Bolsita del pastor, Cardo, Romanza, Chamico, Hierba cana, Senecio, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Verdolaga, Vinagrillo. Otras malezas perennes: Falso té, Achicoria, Siete venas, Hierba azul, Galega, Junquillo, Chufa o Coquillo, Correhuela, Malva, Zarzamora.	2,0 – 4,0	Aplicar selectivamente sobre la maleza entre hileras, evitando mojar el cultivo.

APLICACION

- Se recomienda diluir **PARAQUAT DICHLORIDE 27,6% SL** de preferencia con un volumen de agua entre 200 y 600 L/ha.
- Aplicar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo o con baja infestación y dosis mayor con malezas de mayor tamaño y alta infestación.
- No utilizar **PARAQUAT DICHLORIDE 27,6% SL** en maleza seca o de excesivo crecimiento.
- Como herbicida: realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada. El intervalo de aplicación es variable, según rebrote de las malezas perennes o una nueva generación de anuales.
- Como desecante foliar máximo una aplicación por temporada.
- Retirar del terreno todos los artículos (trapos, huapies, etc.) que hayan quedado embebidos con el producto y disponer de ellos de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente.
- Al momento de realizar la aplicación deberán disponerse de letreros de advertencia indicando día y hora del tratamiento y el tiempo de reingreso al área tratada. Sólo los aplicadores pueden estar en el lugar o próximos a éste, al momento de realizar la aplicación.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **PARAQUAT DICHLORIDE 27,6% SL**, y completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

FITOTOXICIDAD

Fitotóxico para todas las plantas con cuyo follaje entra en contacto.

INCOMPATIBILIDAD

PARAQUAT DICHLORIDE 27,6% SL es incompatible con materiales alcalinos y surfactantes aniónicos.

PERIODO DE CARENCIAS (Días)

Como desecante foliar 21 días. Para el resto de los cultivos y tratamientos no corresponde debido a la naturaleza de la aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO

Personas: Impedir durante 24 horas el ingreso al sector tratado sin equipo de protección.

Animales: En el caso de animales esperar 21 días para permitir el ingreso.