

KENTO 40 SC

INGREDIENTE ACTIVO	Mepanipirima
NOMBRE QUIMICO	N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il) anilina
GRUPO QUIMICO	Anilnopirimidinas
CONCENTRACION Y FORMULACION	436 g/ L/ Suspensión concentrada (SC)
MODO DE ACCION	Contacto
FABRICANTE/ FORMULADOR	Kumiai Chemical Industry Co, Ltd 4-26 Ikenohata 1 –chome, Taitoh-ku. Tokio 1108782, Japón
DISTRIBUIDOR EN CHILE	DuPont Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo II. Moderadamente peligroso LD50 producto comercial: dermal > 2000 mg/ kg (rata) oral > 5000 mg/ kg (rata)
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico.
AUTORIZACION SAG N°	2838

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

KENTO 40 SC es un fungicida de contacto, con acción preventiva, de largo efecto residual, recomendado para el control de Botritis y acción complementaria sobre Oídio en Vides de mesa, viníferas y pisqueras.

KENTO 40 SC actúa interfiriendo con el ciclo de vida del hongo, principalmente durante los procesos de infección y penetración del micelio dentro de la planta huésped. Presenta acción preventiva, largo efecto residual y resistente al lavado por lluvias. No presenta resistencia cruzada con fungicidas benzimidazoles, carboximidas y N-fenilcarbamatos.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
		cc/ hL	
Vides de mesa, Vides viníferas y Vides pisqueras (parronal español)	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Acción complementaria sobre: Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	Floración: 60–80 cc/100L de agua (mínimo 0.8 L/ha) Cierre de racimo, pinta y precosecha: 80-100 cc/100L de agua (mínimo 1.0 L/ha)	Aplicar en estados críticos con condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades (flor, cierre de racimos, pinta y pre cosecha). Emplear dentro de un programa de manejo anti-resistencia, alternando siempre con productos de diferente modo de acción. Utilizar volumen de agua mínimo de 1.000 L/ha permitiendo una óptima cobertura según desarrollo y fenología del cultivo. Para volúmenes mayores a 1.000 L de agua/ha, respetar las dosis por concentración.
Vides viníferas y Vides pisqueras (espaldera)		80-100 cc/100L de agua (mínimo 0.8 L/ha)	Aplicaciones dirigidas a los racimos. Utilizar volumen de agua mínimo de 800L/ha permitiendo una óptima cobertura según desarrollo y fenología del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agitar el envase antes de su uso. Colocar agua en el estanque de la pulverizadora hasta la mitad; agregar la dosis indicada de **KENTO 40 SC** con el agitador funcionando y completar con agua hasta el volumen requerido.

APLICACIÓN POR TEMPORADA: No realizar más de dos aplicaciones por temporada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

INCOMPATIBILIDAD: No presenta incompatibilidades. En caso de dudas realizar una prueba previa a la aplicación y/o consultar a nuestro Departamento Técnico.

COMPATIBILIDAD: Compatible con otros productos de uso común.

TIEMPO DE REINGRESO: Las personas no deben reingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde debido a que los cultivos no se destinan a alimentación animal.

CARENCIAS: Vides: 7.

PRECAUCIONES: No tóxico para aves y abejas. Tóxico a peces y organismos acuáticos. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases.