



## Ficha Técnica Fungicidas

### Custodia® 320 SC

#### **CUSTODIA® 320 SC**

INGREDIENTE ACTIVO

NOMBRE QUIMICO

GRUPO QUIMICO

CONCENTRACION Y FORMULACION

MODO DE ACCION

FABRICANTE/ FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

TOXICIDAD

Azoxistrobina, Tebuconazol

(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-ilo]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo, (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol

Azoxistrobina pertenece al grupo químico de los Metoxiacrilatos y Tebuconazol pertenece al grupo químico de los Triazoles.

120 g/ L, 200 g/ L

Sistémico y de contacto

**Adama Andina B.V. Sucursal Colombia**

**Adama Chile S.A.**

Grupo II. Producto moderadamente peligroso

LD50 producto comercial:

dermal > 5000 mg/ kg (rata)

oral > 2237.8 mg/ kg (hembras); 3864.7 mg/ kg (machos)

ANTIDOTO

AUTORIZACION SAG N°

No tiene antídoto específico. Tratamiento base.

2813

#### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**CUSTODIA® 320 SC**, es un fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva, curativa y erradicante que combina la acción de los ingredientes activos Azoxistrobina y Tebuconazol. Específicamente, Azoxistrobina inhibe la germinación de esporas y el crecimiento de micelios, mientras que Tebuconazol es un fungicida que es absorbido rápidamente por las partes vegetativas y es un inhibidor del ergosterol, actuando eficazmente en el control de enfermedades foliares.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

| Cultivos                     | Enfermedades   | Dosis (L/ ha) | Observaciones  |
|------------------------------|--|---------------|--|
| Uva vinífera,<br>Uva de mesa | Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> );<br>Pudricion gris ( <i>Botrytis cinérea Pers.</i> )   | 1.5 – 2.0     | Aplicar desde inicio de brotación (brotes 15-20 cm) hasta cierre de racimos. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada. Para intervalos cortos de protección aplicar cada 7 a 12 días en función de la presión de oídio existente. Para intervalos largos de aplicación realizar aplicaciones cada 10-12 días.<br>En Uva Vinífera utilizar un volumen de aplicación de 600-1200 L/ ha.<br>En uva de Mesa utilizar un volumen de aplicación de 800-1500 L/ ha. Utilizar la dosis máxima a intervalos cortos frente a alta presión de la enfermedad. |
| Trigo                        | Polvillo estriado o Roya ( <i>Puccinia striiformis</i> ),<br>Mancha foliar o Septoriosis de la hoja ( <i>Mycosphaerella graminicola</i> ),<br>Anam.: Septoria tritici),<br>Roya de la Hoja ( <i>Puccinia triticina</i> ) | 0.8 – 1.0     | Aplicar inicialmente al detectarse la infección y con hoja bandera completamente desarrollada. Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 25-30 días. Usar dosis mínima en aplicaciones preventivas en intervalos de 25 días y dosis máxima en aplicaciones preventivas y curativas con intervalos de 30 días. Utilizar un volumen de aplicación de 200-300 L/ ha.  |

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email [secretaria.cl@adama.com](mailto:secretaria.cl@adama.com)

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email [sanfernando@adama.com](mailto:sanfernando@adama.com)

[adama.com/chile](http://adama.com/chile)



## Ficha Técnica Fungicidas

### Custodia® 320 SC

#### INSTRUCCIONES DE USO

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| Tomate | Oídio ( <i>Erysiphe polygoni</i> , <i>Leveillula taurica</i> ); Fulvia ( <i>Fulvia fulva</i> ); Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> (apareamiento A1)) | 0.6 – 0.8 (130 – 150 cc/ 100 L de agua)* | Aplicar inicialmente al detectarse la enfermedad. Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 7-10 días. Usar dosis mínima en aplicaciones preventivas en intervalos de 7 días y dosis máxima en aplicaciones preventivas con intervalos de 10 días y curativas con intervalos de 7 días. Utilizar un volumen de aplicación de 400-600 L/ ha. *Tomate al aire libre. Para tomate bajo invernadero aplicar según concentración. |
| Raps   | Pudrición blanca ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )  | 1.25 L/ha                                | Aplicar preventivamente a inicios de floración con 15-20% de flor. Realizar una segunda aplicación si existe una alta presión de la enfermedad luego de la primera aplicación, con 50-60% flor hasta antes de caída de pétalos.<br>N° máximo de aplicaciones: 2.<br>Mojamiento: 200 L/ha para aplicaciones terrestres y 60 L/ha para aplicaciones aéreas.  |

#### PERIODO DE CARENCIA (días)

Uva de mesa (3 días), Tomate (5 días), Trigo (58 días), Raps (35 días).

#### TIEMPO DE REINGRESO

Se puede reingresar 12 horas después de la aplicación del producto. Para animales no corresponde un periodo de resguardo, pues el objetivo de los cultivos no es la alimentación animal (pastoreo).

#### COMPATIBILIDAD

**CUSTODIA® 320 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

#### PRECAUCIONES

Vierta en el tanque de preparación la dosis a ocupar **CUSTODIA 320 SC** en la mitad del volumen de agua total a emplear manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea, y finalmente rellene con el agua faltante.

Según las recomendaciones de uso **CUSTODIA® 320 SC** no es fitotóxico.

No es tóxico para las abejas ni para aves. Tóxico para peces y organismos acuáticos. No asperjar sobre o cerca de ríos ni tranques o cauces de agua.

**CUSTODIA® 320 SC** es incompatible con productos de reacción alcalina o ácida. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a una pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

© Marca registrada por Irvita Plant Protection N.V.

## ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email [secretaria.cl@adama.com](mailto:secretaria.cl@adama.com)

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email [sanfernando@adama.com](mailto:sanfernando@adama.com)

[adama.com/chile](http://adama.com/chile)