



FOKKAMEL EXTRA

CERTIFIED the art of growing

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FOKKAMEL EXTRA es un sustituto lácteo para terneros formulado especialmente para programas de crecimiento acelerado. Contiene un 12,5% de leche en polvo. Su alto contenido de proteínas, consistentes en una combinación de suero y caseína, es excelente para optimizar el crecimiento de los terneros. Además, **Fokkamel Extra** está fortificado con inmunoglobulinas de leche, que refuerzan la salud de los terneros, previniendo problemas digestivos.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Proteína de suero: rápida digestión → Estimula ingesta de forraje
- ✓ Leche descremada en polvo: gran sabor → Aumenta ingesta de leche
- ✓ Altos niveles de nutrientes → alimentación intensiva
- ✓ Las inmunoglobulinas refuerzan la salud del ternero.

Rico en Inmunoglobulinas

¡La primera línea de defensa inmunológica!

- Protección contra patógenos entéricos
- Identificación y neutralización de virus y bacterias
- Fuente: proteína de suero ultra filtrada

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES

Proteína	%	24,0
Grasa	%	20,0
Ceniza	%	8,0
Fibra	%	0,02
Humedad	%	4,0
pH		5,8-6,3
Lactosa	%	42,5
Inmunoglobulinas	ppm	1500
Aceite de manteca	ppm	2500
Lisina	%	2,00
Metionina	%	0,50
Treonina	%	1,20
Aditivos fitogénicos	ppm	20

ADITIVOS

ANTIOXIDANTES		
BHT	ppm	30
VITAMINAS		
Vitamina A	IU/kg	25000
Vitamina D	IU/kg	4500
Vitamina E	mg/kg	300
Vitamina C	mg/kg	300
Vitamina B1	ppm	16
Vitamina B2	ppm	10
Vitamina B6	ppm	10
Vitamina B12	ppb	80
Vitamina K	ppm	5,5
Ácido fólico	ppm	1,0
Ácido pantoténico	ppm	23
Niacina	ppm	50
OLIGOELEMENTOS		
Fe	ppm	150
Zn	ppm	170
Mn	ppm	40
Cu	ppm	10
I	ppm	1,3
Se	ppm	0,4

COMPOSICIÓN

- Suero en polvo
- Aceites vegetales (palma/coco – 60/40)
- Concentrado de proteína de suero
- Leche descremada en polvo
- Concentrado de proteína de trigo (hidrolizada)
- Premezcla





FOKKAMEL EXTRA

CERTIFIED the art of growing

EMPAQUE

FOKKAMEL EXTRA se presenta en sacos de 25 kg

ALMACENAJE

- ✓ Evite almacenar este producto en ambientes cálidos y manténgalo siempre alejado de la exposición directa a los rayos solares.
- ✓ Nunca almacene el producto en áreas húmedas o cerca de fuentes de agua.
- ✓ Asegúrese de que el área de almacenaje esté siempre limpia y libre de insectos.

MANEJO DE LOS TERNEROS

- **Calostro → Entregar calostro de alta calidad:**
 - 1) lo antes posible
 - 2) la mayor cantidad posible
 - 3) lo más seguido posible
- **La temperatura óptima para beber es de 39°C. Verifíquela cuidadosamente.** Para preparar el sustituto se recomienda disolver el polvo en 2/3 del volumen total de agua requerida a 55 a 60° C. Después agregar la cantidad de agua restante a temperatura ambiente. Nunca disuelta en agua a más de 60° C.
- Administre concentrado desde el tercer día de vida en adelante. Entregue pequeñas cantidades al comienzo, aumentando según el consumo. Cambie el alimento con regularidad. Los terneros se pueden destetar una vez que consumen más de 2,0 kg de concentrado al día.
- Controle con regularidad el color y solidez de las heces.
- La higiene es esencial: limpie cuidadosamente con detergente todos los materiales que están en contacto con la leche.
- Mantenga siempre agua potable fresca disponible desde el tercer día de edad.

- Entregue forraje en forma de heno o paja picada.
- Los sistemas automáticos de alimentación debe ser calibrados en forma regular. Conviene programar la temperatura del agua a 42°C y verificar con frecuencia.

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN

Proporción mezcla = 145 – 180 g / 1L de agua

Temperatura de toma = 39° C

La temperatura de dilución no debe exceder los 60° C

ESQUEMA ALIMENTACIÓN			
Edad	Calostro		
1ª toma	antes de 4 horas post parto – 4L		
2ª toma	antes de 12 horas post parto – 2,5 L		
	Esquema convencional L / ración	Esquema Inensivo L / ración	Raciones / día
día 2-7	2	3	2
semana 2	2,5	4	2
semana 3	3	4	2
semana 4	3	4	2
semana 5	3	4	2
semana 6	3	4	2
semana 7	2,5	3	2
semana 8	2	3	2
semana 9	1	2	2
semana 10		1	2

- Nuestro esquema de alimentación es una guía. La cantidad de sustituto debe ajustarse a las necesidades de los terneros
- Como regla general, los terneros deben tomar 10-15% de su peso corporal/día durante la primera semana, y 15-20% de su peso corporal/día desde la segunda semana.

