

AMITRAZ 12.5%

**Solución externa
REG. SAG Nº 261**

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Amitraz 12.5 g

Excipientes c.s.p.

PROPIEDADES

El producto tiene acción bloqueadora sobre la 5HT y una acción agonista con los 2-alfa-adrenoreceptores causando una depresión del sistema nervioso central del parásito. A la vez interactúa con receptores de octopamina en el sistema nervioso del parásito induciendo un aumento de la actividad neuronal del parásito. Produce también una activación de la enzima adenilciclase e inhibición de la acetilcolinesterasa causando bloqueo de las transmisiones nerviosas en el parásito por el daño en el funcionamiento del sistema nervioso. Además inhibe la enzima mono-aminooxidasa, encargada del metabolismo de las aminas neurotransmisoras presentes en el sistema nervioso de los parásitos.

ESPECIES

Perro.

INDICACIONES

Control de garrapatas (*R. sanguineus*), así como piojos (*T. canis*) y ácaros de la sarna (*S. scabiei*, *N. cati*, *D. canis*) en perros.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Tópica.

- ✓ Diluir 1.5 ml de Amitraz 12.5% en 1 L de agua. Con esta solución empapar completamente al animal. No enjuagar ni secar al animal después del tratamiento.

Preparar solamente la cantidad de baño que se necesite para el tratamiento.

Se recomienda repetir el procedimiento cada 2 semanas hasta no detectar microscópicamente ácaros o huevos viables en los raspados de piel.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en cachorros menores de 4 meses de edad ni en perras gestantes. No usar en Chihuahua, Fox terrier o Poodle enano. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa. No aplicar en perros con pioderma profundo con trayectos de drenaje, solo aplicar cuando mejoren las lesiones.

EFFECTOS NO DESEADOS

Pueden presentarse casos de prurito, polidipsia/poliuria, bradicardia, hipotermia, hiperglicemia y convulsiones.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Utilizar guantes durante la aplicación del producto. Evitar el contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapores y el contacto del producto con el fuego.

Evitar el contacto con los animales recién tratados.

Evitar que el perro se lama el pelo tras el tratamiento. No bañar en horas de intenso calor ni con tiempo lluvioso.

Solo para uso externo, utilizar con cautela en pacientes epilépticos.



PRECAUCIONES PARA QUIEN LO APLICA

Utilizar equipo de seguridad durante su aplicación (guantes, mascarilla, anteojos protectores, delantal impermeable). Evitar el contacto con los ojos y piel. No comer, beber, fumar ni respirar sus rocíos durante su aplicación. Evitar inhalación de vapores y contacto con el fuego. Evitar en contacto con los individuos recién tratados. Preparar la dilución en un lugar bien ventilado. En caso de ingesta accidental, no inducir el vómito y buscar asistencia médica inmediatamente.

PRESENTACIÓN

Tarro hojalata de 120 ml

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA.