



## Temprid SC

---

### Temprid SC

**Uso:** Profesional.

**Denominación:** Insecticida residual para rastreros y voladores

**Formulación:** Suspensión concentrada.

#### Composición:

Imidacloprid.....	21% p/p
Beta Ciflutrina.....	10,5% p/p
Emulsionantes, agua, c. s .p.....	100% p/p

**Modo de acción:** por contacto e ingestión.

#### Propiedades de la formulación:

Al ser **Temprid SC** un producto que al combinar dos principios activos exclusivos con la más alta tecnología Bayer, provoca que el insecto sea controlado de dos formas diferentes al mismo tiempo en el sistema nervioso. Por ésta novedosa acción es su uso fundamental para el manejo de resistencia, como así también en el programa de rotación de productos.

#### Plagas que controla:

**Rastreros:** cucarachas (alemana y americana); garrapatas; hormigas de interiores, hormigas de la madera, chinches de la cama, pulgas.

**Voladores:** moscas; zancudos.

#### Dosificación:

Pulverizar las superficies donde se observe presencia de insectos, excrementos, partes del cuerpo,.. Dejar una fina capa insecticida sobre el material: azulejos, ladrillos, mosaicos, madera...

Las dosis indicadas para cucarachas, hormigas de interiores, chinches de la cama :**2 ml de Temprid SC** por litro de agua .Para garrapatas, pulgas, moscas, mosquitos y hormigas de la madera: **4 ml de Temprid**



## Temprid SC

---

**SC** por litro de agua . Un litro de solución alcanza para tratar 20 metros cuadrados de superficie.

### **Recomendaciones previa a la aplicación:**

- Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto.
- Retirar todo tipo de alimentos.
- Mediante monitoreo de plaga Identificar los posibles lugares a tratar.

### **Modo de uso:**

- Agitar el frasco
- Utilizar la dosis correcta dependiendo de la plaga y la cantidad de emulsión a preparar.
- Pulverizar las superficies previamente identificadas.
- Interiores: zócalos, rejillas, cajones, alacenas, bajo mesadas, pisos, paredes, muebles,...
- Exteriores: paredes; zócalos, pasto; arbustos perimetrales,...
- No aplicar sobre plantas en época de floración.
- Para el control de insectos voladores en exteriores establecer los horarios de mayor actividad de los mismos,. Ej: Zancudos efectuar los tratamientos temprano por la mañana (5 a 8 am) o por la tarde ( 18 a 21 pm) ;

### **Recomendaciones durante la aplicación:**

Usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara

No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto..

Durante la aplicación solo el operario estará presente en la misma.

### **Recomendaciones posteriores a la aplicación**

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
- Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.



## Temprid SC

---

- Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos.
- Prologar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc.
- No lavar las superficies aplicadas durante 3 a 10 días posteriores a la aplicación

### **.Intervalo entre aplicaciones**

Al ser un insecticida residual se recomienda en interiores hacer aplicaciones cada 20 a 30 días dependiendo de la infestación presente.

En exteriores se recomienda aplicar cada 7 / 15 días, o inmediatamente después de una lluvia.

### **Efecto insecticida**

El efecto insecticida de **Temprid SC** comenzará a las 24 horas después de aplicado.

### **Seguridad:**

No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas)...

### **Riesgos ambientales:**

Evitar que penetre en las aguas superficiales, alcantarillado y aguas subterráneas.

### **Almacenamiento:**

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños y mascotas

### **Primeros auxilios:**

**Ropa contaminada:** quitarse inmediatamente y retirarla en forma controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso diario..



## Temprid SC

---

**Inhalación:** Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.

**Contacto con la piel:** Lavarse inmediatamente con jabón y agua abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo

**Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar médico toxicólogo.

**Ingestión:** Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar con un médico toxicólogo.

En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el envase con la etiqueta o la ficha técnica del producto..

**Observaciones:** Si no puede identificar la plaga a controlar, o a tenido inconvenientes previos en su control, se sugiere consultar con Bayer Environmental Science.

## Registros ISP N° P-715/14

---

Bayer: Science For A Better Life  
Environmental Science  
Bayer S.A., Chile  
Crop Science Chile  
Av. Andrés Bello N° 2457  
Providencia, Santiago de Chile, Chile  
Teléfono: +56 2 2520 8200  
Web: [www.bayer.cl](http://www.bayer.cl)