



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

Cuprosan

DESCRIPCION	
GRUPO	Fertilizante foliar en base a Cobre.
TIPO	Corrector de deficiencias foliares.
GRADO	Fertilizante natural en base Cobre acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	
Ingrediente Activo	Sulfato de Cobre Pentahidratado 22,4% p/v
Densidad a 20°C	1,12 g/ml
pH (0,1%)	4,2
Formulación	Concentrado Soluble-SL
Modo de acción	Absorción foliar

CARÁCTERISTICAS
Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Es 100 % natural, aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.
Su aporte mineral ayuda a corregir deficiencias nutricionales del mineral.
Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 4 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal

Cuprosan

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA
Uva de Mesa y Vinífera	Iniciar la aplicación con brotes de 3 a 4 hojas, repitiendo hasta flor. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	2
	Aplicar desde la pinta hasta la pre-cosecha. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Durazneros, Nectarinos, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Almendros	Aplicar en otoño previo y durante caída de hojas 1 a 4 veces, yema hinchada: 1 a 4 veces y poda de limpieza: 1 a 4 veces. 1 a 4 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Perales	Aplicar cuando se observen las primeras flores, repitiendo en plena flor. 2 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Manzanos	Efectuar las aplicaciones en otoño, durante la caída de hojas. 1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Cítricos y Paltos	Aplicaciones otoñales, especialmente después de lluvias. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Nogal, Avellano Europeo, Almendro	Aplicar desde floración hasta fruto cuajado, repetir cada 7 días. Mojamiento 1500 -2000 L agua/ ha.	1,50 – 2,00
Hortalizas: Tomates, Pimentones, Lechugas, Repollo, Coliflor, Brócoli	Desde 15 a 20 cm de altura de planta, repetir cada 10 a 12 días, con un máximo de 5 aplicaciones por temporada.	0,75-1,50
Papas	Desde 15 a 20 cm de altura de planta, repetir cada 10 a 12 días. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
Frutillas, Frambuesos, Arándanos	1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25

INSTRUCCIONES DE USO Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. **Cuprosan** puede ser aplicado vía aérea o terrestre.

MANEJO DEL PRODUCTO Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) Cuprosan

PERIODO DE REINGRESO Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

GARANTIA Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

PRESENTACIÓN Envase de 5 y 20 litros

ADAMA