

Helvetica - Cuerpo 8

Helvetica - Cuerpo 40, 20, 12, 8

Helvetica - Cuerpo 8

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Acetamiprid, ingrediente activo de **PREDATOR®**, pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar overol impermeable, guantes impermeables, botas de goma y protector facial. Durante la aplicación usar traje impermeable completo, guantes impermeables, botas de goma y máscara con filtro. No fumar, comer o beber durante la aplicación del producto y lave las manos y cara profundamente antes de realizar esas acciones. No contaminar utensilios de comida, alimentos, agua potable o cualquier curso de agua. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Después de la aplicación lavar con agua las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Durante la aplicación mantener alejado a los animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nocivo por inhalación y por ingestión. Provoca irritación en los ojos y leve irritación de la piel. La inhalación del vapor puede producir irritación de las vías respiratorias. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar enrojecimiento e hinchazón. La exposición prolongada puede causar dolores de estómago, vómitos y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco inmediatamente. Mantener al paciente en reposo. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno y solicitar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, removerlos después de los 5 minutos y luego continuar con el enjuague hasta completar los 15 ó 20 minutos. En caso de irritación consultar a un médico.

En caso de ingestión: No inducir el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve a un centro hospitalario inmediatamente. Si es ingerido, dar a beber 2 vasos de agua sólo si el afectado está consciente y acudir inmediatamente a un centro asistencial.

Notas para el médico tratante: No tiene antídoto específico.

Aplique tratamiento base.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Información Ecotoxicológica: **PREDATOR®** es ligeramente tóxico para abejas, es prácticamente no tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos. No contaminar cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Triple lavado de envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar el producto en su envase original, en un área fresca-seca, ventilada, no expuesta a temperaturas extremas (<10°C, >40°C). Evitar su acceso a personas no autorizadas. Evitar contaminación con otros plaguicidas, fertilizantes, alimentos y forrajes. Además, prevea episodios de emergencia y, en función de ello, tome las medidas del caso.

PREDATOR®

Insecticida Concentrado Soluble SL

Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.838
Fecha Vencimiento:

PREDATOR® es un insecticida sistémico y de contacto selectivo para el control de insectos, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICION:

* Acetamiprid.....22,5% p/v (225 g/L)
Coformulante c.s.p.....100% (1 L)
*(E)-N'-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N²-ciano-N¹-metilacetamida

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**INFLAMABLE
CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Importado y Distribuido en Chile por:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET1838V-003-01
OS3

Fabricado por:
Arysta LifeScience Sud Africa
PO Box 1726, Mount Edgecombe, 4300
Sud África

Jiangsu Kesheng Group CO., LTD
888, Yanhuai Road, Jianhu County, Jiangsu
China



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

PREDATOR® es un insecticida sistémico y de contacto selectivo para el control de insectos, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, actuando como un análogo de acetilcolina (Ach), que es un transmisor químico natural de los impulsos. Es un insecticida neonicotinoide, que genera la hiperexcitación del sistema nervioso, resultando en la muerte del insecto.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Plaga	Dosis cc/100 L agua	Observaciones
Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Plumcots, Pluots, Cerezos, Damascos y Almendros	Escama de San José (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>) Trips Californiano (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Polilla Oriental de la Fruta (<i>Cydia molesta</i>).	36-45 35-45 35-45	Aplicar según monitoreo de plagas con frecuencia máxima de 15 días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora o pulverizadora con un mojamiento de 1.500 a 2.500 L de agua/ha. Volúmenes mayores a 2.500 L de agua/ha, mantener la concentración. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos de carencia. Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia mínima de 15 días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora o pulverizadora con un mojamiento de 2.000 L de agua/ha. Volúmenes mayores a 2.000 L de agua/ha, mantener la concentración. Realizar máximo 4 aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos de carencia.
Manzanos, Perales y Membrilleros	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>) Chanchito blanco de la manzana (<i>Pseudococcus viburni</i>) Escama de San José (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>) Pulgón Lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	36	Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia mínima de 14 días y máxima de 25 días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora o pulverizadora con un mojamiento equivalente a 1.000 a 2.500 L de agua/ha. Volúmenes mayores a 2.500 L de agua/ha, mantener la concentración. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos de carencia.
Uva de mesa, vinífera y pisquera	Trips Californiano (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	35-45	Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia mínima de 7 días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora y pulverizadora con un mojamiento de 800 -1.800 L de agua/ha. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos de carencia.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar la cantidad recomendada de **PREDATOR®**, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

INCOMPATIBILIDAD: PREDATOR® es incompatible con productos de reacción alcalina y/o fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad en los cultivos recomendados en la etiqueta.



PERIODO DE CARENCIAS (días): Durazno, Cereza, Nectarín, Damasco, Almendra: 7; Ciruela, Plumcot, Pluot: 14; Manzanas, Peras, Membrillos: 7; Vides: 15. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

TIEMPO DE REINGRESO: Las personas no deben reingresar al área tratada hasta 24 horas después de su aplicación. No corresponde indicar tiempo de reingreso para animales por el tipo de cultivo en el que se recomienda el producto.

Otras informaciones: Para evitar la resistencia a los insecticidas evite el uso repetido de insecticidas del mismo grupo (Grupo 4A – Insecticida) y alternar con productos de diferentes grupos. Integrar los métodos de control (químico, cultural, biológica) en los programas de control de insectos.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

PREDATOR® es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.



Verde, Pantone 347 C

Negro, Pantone negro 100%