

## FICHA TÉCNICA

### **PUELCHE -VTO<sup>®</sup> (WP) BIOESTIMULANTE**

**PUELCHE -VTO<sup>®</sup>** es un Bioestimulante en base a *Trichoderma* spp. y *Bacillus* spp. lo que logra un producto con gran poder de secado, alta efectividad y rapidez de cobertura.

La formulación de **PUELCHE-VTO<sup>®</sup>** está compuesta por endosporas y conidias, las que son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia más resistentes de la naturaleza, pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad.

#### Formulación

<i>Trichoderma</i> spp.	0.6% p/p (6 g/Kg)
<i>Bacillus</i> spp.	0.9% p/p (9 g/Kg)
Coformulantes c.s.p.	100% p/p (1 Kg)

## CUADRO INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (g /hl)	OBSERVACIONES
Vid	100 - 150	Aplicación en Pre flor, flor, post flor, apriete, pinta, pre cosecha, con mojamientos de 1.000-2.000 L.
Arándano	100 - 150	Aplicación en cuaja, pinta, pre cosecha y cosecha, con mojamientos de 500-1.000 L.
Carozos	100	Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha, con mojamientos de 1.000-2.000 L.
Tomate	100	Aplicación en almacigo, trasplante, post trasplante con mojamientos de 400 - 1000 L.
Palto	100 - 150	Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha con mojamientos de 1.000-2.000 L.
Manzano	100 - 150	Aplicación en Pre flor, flor, cuaja y estado T, con mojamientos de 1.000-2.000 L.
Cítrico	100 - 150	Aplicación en inicio flor, 50% flor, cuaja, precosecha, con mojamientos de 1.000-3.000 L.

**Preparación de la mezcla:** Diluir en un recipiente con agua, la cantidad necesaria de **PUELCHE - VTO®**, agitando fuertemente; luego dejar decantar por unos minutos, antes de verter en el equipo de aplicación o riego, que previamente ha sido llenado con agua hasta completar el nivel necesario para la aplicación.

La utilización de la mezcla debe hacerse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación constante.

**Incompatibilidad:** Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **PUELCHE - VTO®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**Período de Carencia:** No tiene.

**Tiempo de Reingreso al área tratada:** No posee restricciones para el reingreso al área tratada.

**Almacenaje:** **PUELCHE - VTO®** debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 10 meses.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONDO: +56-2-26353800**  
**CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONDO: +56-2-22473600**  
**ATENCIÓN LAS 24 HORAS**

**BIO INSUMOS NATIVA SPA +56 - 71 2970696/2970698.**