
FICHA TÉCNICA

CENTEON MAX[®] (WP)

BIOFERTILIZANTE

CENTEON MAX[®] WP es un Biofertilizante en base a dos cepas de *Trichoderma* spp. y una cepa de *Bacillus* spp., formulado en polvo mojable, con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas. Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo.

Promueve la estimulación natural del crecimiento de las plantas, activando el desarrollo de raíces. Su aplicación preventiva ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés tanto de origen biótico y abiótico.

Certificaciones

Visado para Agricultura Orgánica Nacional

Composición WP

<i>Trichoderma</i> spp.	2,4% p/p (24 g/kg)
<i>Bacillus</i> spp.	1,2% p/p (12 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100% p/p (1 kg)

Metales Pesados

Arsenico	3,178 (mg/Kg As)
Cadmio	<0.010 (mg/Kg Cd)
Mercurio	0.106 (mg/Kg Hg)
Plomo	6,320 (mg/Kg Pb)

N.D = NO Detectado

*Limite de detección Cadmio 0.001 mg/kg

**Limite de detección Mercurio 0.001 mg/kg

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Hortalizas	2 a 5 g/l de agua o 1 a 2 kg/ha	Aplicación desde siembra o trasplante, hasta cosecha. Aplicación al sustrato o mediante inmersión de plántulas o con el riego.
Berries	1 a 2 kg/ha (dosis mínima 200 g/100 l de agua) 1 a 2 kg/ha (dosis mínima 200 g/100 l de agua)	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, aplicaciones en brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo. Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento mínimo de 400 a 800 l/ha.
Frutales y vides	1,5 a 2 kg/ha (500 g/100 l de agua) 1 a 2 kg/ha (dosis mínima 100 g/100 l de agua)	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo. Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento de 500 a 2000 l/ha.

Preparación de la mezcla: Diluir en un recipiente con agua la cantidad necesaria de **CENTEON MAX® WP**, agitando fuertemente, luego dejar decantar por un minuto, antes de colocar en equipo de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada, y mantenida en agitación durante la aplicación.

Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **CENTEON MAX® WP** con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Almacenaje: Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 10 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.



Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONOS: +56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONOS: +56-2-22473600

ATENCIÓN LAS 24 HORAS - BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71) 2970696/2970698.

