

## **CLINCHER®**

INGREDIENTE ACTIVO	Cihalofop-butilo
NOMBRE QUIMICO	Ester butílico del ácido (R)-2-[4-(4-ciano-2-fluorofenoxi)fenoxi]propiónico
GRUPO QUIMICO	Ariloxifenoxipropionatos
CONCENTRACION Y FORMULACION	180 g/L = 18% p/v – EC (Concentrado Emulsionable)
MODO DE ACCION	Sistémico de acción postemergente
FABRICANTE / FORMULADOR	Dow AgroSciences Colombia
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Corteva - Dow AgroSciences Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro LD 50 producto comercial: dermal > 5.000 mg/kg oral > 5.000 mg/kg
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico
AUTORIZACION SAG N°	3.354

### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**CLINCHER®** es un herbicida sistémico de acción postemergente, para el control de gramíneas, anuales y perennes, como hualcacho y chéptica en el cultivo del Arroz.

### **INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES TERRESTRES**

<b>Cultivo</b>	<b>Malezas</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Observaciones</b>
Arroz	Hualcacho Chéptica	1,5 - 2	Bajar el agua antes de aplicar. Aplicar una vez que la maleza tenga al menos dos terceras partes de su follaje expuesto. Use las dosis mayores para las malezas más desarrolladas.

### **INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES AEREAS**

<b>Cultivo</b>	<b>Malezas</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Observaciones</b>
Arroz	Hualcacho Chéptica	1,5 - 2	Bajar el agua antes de aplicar. Aplicar una vez que la maleza tenga al menos dos terceras partes de su follaje expuesto. Use las dosis mayores para las malezas más desarrolladas. Utilizar mojamiento de 40 L/ha.

**PERÍODOS DE CARENCIA (días):** Arroz: 30. Esta carencia corresponde a las exigencias del mercado local.

**OBSERVACIONES:** No aplicar si la maleza está sumergida bajo el agua. Se requiere un período libre de precipitaciones de al menos 8 horas. No aplicar con vientos superiores a 8 km/h. Realizar una aplicación por temporada.

**PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN:** Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **CLINCHER®** necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. (100 – 150 L/ha)

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas de contacto. No mezclar con herbicidas hormonales ni sulfonilureas.

**FITOTOXICIDAD:** CLINCHER® no ha inducido fitotoxicidad en arroz.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas ó animales al área tratada.

®Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC.