

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Valifenalato pertenece al grupo de los carbamatos de valinamida y Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos).
- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No almacenarlo con herbicidas volátiles.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, traje protector completo impermeable.
- Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua.
- Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel: Inmediatamente sacarse toda la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua de la llave.

En caso de contacto con los ojos: Retirar los lentes de contacto cuando proceda, lavarlos con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión:** No inducir el vomito. Ver inmediatamente a un médico y presentarle la hoja de seguridad o la etiqueta. Es posible administrar carbón activado suspendido en agua o aceite de vaselina mineral medicinal. No dar nada por la boca ni inducir el vomito si la persona esta inconsciente.

En caso de inhalación: Ventilar el lugar. Remover inmediatamente al paciente del área contaminada y dejarlo en reposo en área bien ventilada. Obtener atención medica.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales: Producto toxico para peces. No toxico para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“INUTILIZARLOS Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“ NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“ LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Teléfonos de emergencia: CITUC - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

En caso de INTOXICACION llamar al ☎: 02-2635 3800

En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 02-2247 3600

Notal al comprador: mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

VALIS M

02.02.15

FUNGICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Valis M es un fungicida que contiene dos ingredientes activos de modo de acción diferente, valifenalato y mancozeb, presentando acción sistémica, preventiva, curactiva, erradicante y antiesporulante. Se recomienda para el control de tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en Papa y Tomate y mildiu (*Peronospora destructor*) en Ajo y Cebolla

Composición

Valifenalato*	6 % p/p (60 g/kg)
Mancozeb**	60 % p/p (600 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100 % p/p (1 kg)

(*) N-(isopropilcarbonil)-L-valil)-(3RS)-3-(4-clorofenil)-β-alaninato de metilo
(**) Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cinquica.

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2726

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote:
Fecha de vencimiento: (mes y año)
Contenido neto:

Fabricado por:
ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153
Milán, Italia.

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.
Via Evangelista Torricelli, 2
48010 Cotignola (Ravenna), Italia.

Importado por:
FMC Corporation Chile Ltda.
Rio Refugio 9663,
Parque de negocios ENEA,
Pudahuel, Santiago de Chile.

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Valis M es un fungicida que contiene dos ingredientes activos de modo de acción diferente, valifenalato y mancozeb, presentando acción sistémica, preventiva, curactiva, erradicante y antiesporulante. Se recomienda para el control de tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en Papa y Tomate y mildiu (*Peronospora destructor*) en Ajo y Cebolla

Cuadro de instrucciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Ajo Cebolla	Mildiu	2 kg/ha	Aplicar al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir si se presentan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, con una frecuencia de 7 días, realizando máximo 4 aplicaciones por temporada. Pulverización por vía líquida empleando 400 L/ha de agua.
Papa Tomate	Tizón tardío	2,5 – 3,0 kg/ha	Usar la dosis menor en aplicaciones preventivas y la dosis mayor al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir si se presentan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad con una frecuencia de 7 días realizando máximo 3 aplicaciones por temporada. Pulverización por vía líquida, empleando 400 L/ha de agua.

Preparación de la mezcla

Disolver la cantidad necesaria de Valis M en un poco de agua. Luego adicionar esta pre mezcla al estanque a medio llenar de agua y completar con agua al volumen requerido manteniendo la agitación constante hasta terminar la aplicación.

Incompatibilidad

Se recomienda mezclar solo con formulaciones de polvos mojables. No mezclar con aceites, polisulfuros y productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad

Valis M no es toxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Periodo de carencia

Ajo y cebolla: 21 días; Papa y Tomate: 7 días.

Tiempo de reingreso

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. No aplicable para animales, pues se recomendarán en cultivos y no en forrajeras.



CUIDADO